

Prodotti per
**avicoli e
selvaggina**

Miscele di piante officinali e oli essenziali
per il benessere dell'**allevamento**

Products for poultry and game birds

*Herbal blends and essential oils
for the well-being of **farmed poultry***



APA 3

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

2 - 3 ml per litro d'acqua.

2 - 3 mL per liter of drinking water.



APA GLUCAL

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

100 - 200 g per 100 litri d'acqua.

100 - 200 g per 100 liters of drinking water.



APACOX 20

Mangime complementare in polvere solubile

Soluble complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

5 g per litro d'acqua

oppure 10 g per kg di mangime completo.

5 g per liter of drinking water

or 10 g per kg of complete feed.



APACOX PLV


Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | Suggestions for use

50 - 100 g per 100 kg di mangime completo.

50 - 100 g per 100 kg of complete feed.



APASYL

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

0,5 ml per litro d'acqua

oppure 30 - 50 g per 100 litri d'acqua.

0,5 mL per liter of drinking water

or 30 - 50 g per 100 liters of drinking water.

APASYL PLUS

Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | Suggestions for use

30 - 60 g per kg di mangime completo.

30 - 60 g per kg of complete feed.



APIMMUNE

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | Suggestions for use

200 - 250 g per 100 kg di mangime completo.

200 - 250 g per 100 kg of complete feed.



1 kg



5 kg



100 g



1 kg



10 kg



5 kg



10 kg



5 kg



60 g



50 g



500 g

AX FLUIDO

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

30 - 90 g per 100 litri d'acqua (disciolti in acqua di bevanda o mangime liquido).

30 - 90 g per 100 liters of drinking water (mix with drinking water or liquid feed).

BIOINTEGRA

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

300 - 1000 g per 100 kg di mangime completo.

300 - 1000 g per 100 kg of complete feed.

BIOSEDAN PLV

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

500 - 1500 g per 100 kg di mangime completo.

500 - 1500 g per 100 kg of complete feed.

CLOBAC OIL AC

Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

GALLINE OVAIOLE, POLLI DA INGRASSO:

100 g per 100 kg di mangime completo oppure 50 g per 100 litri d'acqua.

CHICKENS REARED FOR LAYING OR FOR FATTENING:

100 g per 100 kg of complete feed or 50 g per 100 liters of drinking water.

CLOBIOS

Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

GALLINE OVAIOLE, POLLI DA INGRASSO:

60 g (1 bustina) ogni 25 - 50 kg di mangime completo.

CHICKENS REARED FOR LAYING OR FOR FATTENING:

60 g (1 packet) per 25 - 50 kg of complete feed.

EUBIOTIC


Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*


1 g per litro d'acqua oppure 2 - 3 g per kg di mangime completo oppure 0,5 cucchiaino per kg di mangime completo.

1 g per liter of drinking water or 2 - 3 g per kg of complete feed or 0,5 teaspoon per kg of complete feed.



25 g

100 g



100 g

500 g



10 kg



100 g

500 g

5 kg



10 kg



25 g

100 g

500 g

1 kg

5 kg

EUSPIR 20

Mangime complementare in polvere solubile

Soluble complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

5 g per litro d'acqua
oppure 10 g per kg di mangime completo.

*5 g per liter of drinking water
or 10 g per kg of complete feed.*

GR MICRO

Mangime complementare microincapsulato

Microencapsulated complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

3 - 4 cucchiaini per kg di mangime completo
oppure 30 - 40 g per kg di mangime completo.

*3 - 4 Tablespoons per kg of complete feed
or 30 - 40 g per kg of complete feed.*

GR MICRO 100

Mangime complementare microincapsulato

Microencapsulated complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

100 - 200 g per 100 kg di mangime completo.

100 - 200 g per 100 kg of complete feed.

GREEN TONIC

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 - 2 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 4 g per kg di mangime completo.

*1 - 2 mL per liter of drinking water
or 2 - 4 g per kg of complete feed.*

MAGIC HEN

Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | Suggestions for use

100 - 300 g per 100 kg di mangime completo.

100 - 300 g per 100 kg of complete feed.

NUOVO APACOX

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 - 2 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 4 g per kg di mangime completo
oppure 100 - 200 g per 100 litri d'acqua.

*1 - 2 mL per liter of drinking water
or 2 - 4 g per kg of complete feed
or 100 - 200 g per 100 liters of drinking water.*



25 g



100 g



500 g



1 kg



5 kg



5 kg



25 g



100 g



500 g



1 kg



5 kg



25 g



100 g



500 g



1 kg



5 kg



25 g



100 g



500 g



1 kg



5 kg



10 kg

NUOVO APASPRINT

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

0,8 - 1 ml per litro d'acqua
oppure 1,6 - 2 g per kg di mangime completo
oppure 80 - 100 g per 100 litri d'acqua.

*0,8 - 1 mL per liter of drinking water
or 1,6 - 2 g per kg of complete feed
or 80 - 100 g per 100 liters of drinking water.*

NUOVO CLS

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

80 - 120 g per 100 litri d'acqua.

80 - 120 g per 100 liters of drinking water.

NUOVO GI.RO.VIT

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

0,5 - 1 ml per litro d'acqua
oppure 1 - 2 g per kg di mangime completo.

*0,5 - 1 mL per liter of drinking water
or 1 - 2 g per kg of complete feed.*

NUOVO GR

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

1 ml per litro d'acqua
oppure 2 g per kg di mangime completo
oppure 60 - 100 g per 100 litri d'acqua.

*1 mL per liter of drinking water
or 2 g per kg of complete feed
or 60 - 100 g per 100 liters of drinking water.*

NUOVO TRICOFOOD

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

1 - 2 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 4 g per kg di mangime completo
oppure 100 - 200 g per 100 litri d'acqua.

*1 - 2 mL per liter of drinking water
or 2 - 4 g per kg of complete feed
or 100 - 200 g per 100 liters of drinking water.*

P/L VIT

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

200 - 500 g per 100 kg di mangime completo.

200 - 500 g per 100 kg of complete feed.



PLASMATOX

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

2 ml per litro d'acqua.

2 mL per liter of drinking water.



PRIVIRUM

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 - 2 ml per litro d'acqua oppure 2 - 4 g per kg di mangime completo oppure 100 - 200 g per 100 litri d'acqua.

1 - 2 mL per liter of drinking water or 2 - 4 g per kg of complete feed or 100 - 200 g per 100 liters of drinking water.

PRIVIRUM PLV


Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | Suggestions for use

200 g per 100 kg di mangime completo.

200 g per 100 kg of complete feed.



SPIRULINA MICRO


Mangime complementare microincapsulato

Microencapsulated complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

40 - 60 g per kg di mangime completo oppure 3 - 4 cucchiaini per kg di mangime completo.

40 - 60 g per kg of complete feed or 3 - 4 Tablespoons per kg of complete feed.



TRICO 20

Mangime complementare in polvere solubile

Soluble complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

5 g per litro d'acqua oppure 10 g per kg di mangime completo.

5 g per liter of drinking water or 10 g per kg of complete feed.



TRICOMIX

Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | Suggestions for use

50 - 100 g per 100 kg di mangime completo.

50 - 100 g per 100 kg of complete feed.



ZOOFOOD P/L

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 ml per litro d'acqua oppure 2 g per kg di mangime completo oppure 80 - 120 g per 100 litri d'acqua.

1 mL per liter of drinking water or 2 g per kg of complete feed or 80 - 120 g per 100 liters of drinking water.



APADERM PLUS

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Diluire in acqua al 3 - 10% e irrorare sugli animali e nell'ambiente (gabbie, nidi, attrezzature). Ripetere ogni 1 - 3 settimane.

Dilute with water to a 3 - 10 % solution and spray on animals and in housing areas (cages, nests, equipment). Repeat every 1 - 3 weeks.

APADERM SPRAY

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Irrorare sugli animali, in particolare sotto le ali e la coda. Si può irrorare nell'ambiente (gabbie, nidi, attrezzature).

Ripetere ogni 1 - 3 settimane.

Spray on animals, particularly in areas under wings and tail. Spray in housing areas (cages, nests, equipment). Repeat every 1 - 3 weeks.

APAGEL

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in gel ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts in gel for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Applicare sulle aree interessate della pelle 1 - 2 volte al giorno.

Apply to affected skin 1 - 2 times daily.

APAGEL FLUIDO

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Diluire in acqua al 10 - 20% e irrorare sugli animali e nell'ambiente (gabbie, nidi, attrezzature).

Dilute with water to a 10 - 20% solution and spray on animals and in housing areas (cages, nests, equipment).

APAGEL SPRAY

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Applicare sulle aree interessate della pelle 1 - 2 volte al giorno.

Apply to affected skin 1 - 2 times daily.

SOLUZIONE OFTALMICA

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Pulire il contorno dell'occhio con una garza imbevuta di prodotto una o più volte al giorno.

Clean eye rim with a moistened gauze, once or more daily.

Allevare secondo natura

Oltre trent'anni di **ricerca e innovazione** dedicati alla messa a punto di **specifiche miscele** con ingredienti a effetto fisiologico e nutritivo a base di **estratti vegetali**, per favorire e **promuovere il benessere degli animali**.



www.greenvet.com

Farm with nature

Over **thirty years** of **innovative research** dedicated to the development of select **herbal blends** of **ingredients with nutritive effects** for the **well-being** of animals.